

Fjernelse af børnepolypper

Vigtigt før operationen

Der må ikke indtages blodfortyndende medicin 2 uger før, samt 2 uger efter indgrebet, ex. *Acetylsalisylsyre*.

Der må ikke i samme periode, indtages kosttilskud/alternativ medicin med: Fiskeolie, hvidløg, ingefær, ginseng og ginkgo biloba.

Egen læge informeres om operationen ved den efterfølgende kontrol.

Øre-næse-hals-klinikken

Dyrehavevej 19

3400 Hillerød

Tlf.: 4826 7730

www.dyrehavevej19.dk

Revideret maj 2019/hr

Hvad er børnepolypper?

- En del af svælgets immunforsvar
- Alle har større eller mindre børnepolypper
- Få har for store polypper
- Ikke det samme som næsepolypper
- Forkølelsesvirus sætter sig i børnepolypperne, så de vokser

Hvorfor fjernelse af børnepolypper?

- Børnepolyppfjernelse foretages for at bedre luftpassagen i næsen
- Nedsætte tendensen til kronisk forkølelse
- Bedre funktion af det eustakiske rør og derved forbedre hørelsen ved ophør af langvarigt undertryk med slim i mellemøret

Problemer ved fjerne af børnepolypper

- Operationen foregår i fuld bedøvelse
- Kun få gener
- Let blødning fra næsen. Vi anbefaler en dag hjemme, blød kost og ingen varme drikke eller varm mad det første døgn.
Is er altid en god ting!
- Der er få smerter efter indgrebet, oftest irritation i hovedet efter bedøvelsen
- Der kan imidlertid opstå åbent snøvl (ændret tale) et stykke tid efter operationen pga. ændret resonansrum

Grunde til manglende effekt af polyppfjernelse

- Allergi eller fortykket slimhinder i næsen
- Skæv næseskillevæg
- Fortsat snævre eustakiske rør
- Gendannelse af børnepolypper kan forekomme

Derfor er regelmæssig kontrol vigtig!

