

Jesper Hald og Jeppe Schwenger
Speciallæger i øre, næse, halssygdomme
Dyrehavevej 19, 3400 Hillerød, tlf.: 48267730

Vejledning for børn, som skal have fjernet dræn og lappet trommehinden

Mødetid: _____ dag d. _____ / _____ kl.

På operationsdagen:

Barnet må ikke få noget at spise, dvs. skal faste, **6 timer før operationen.**

Barnet må dog spise sodavands-is, drikke vand, saftvand og the uden mælk indtil **2 timer før operationen.**

Såfremt barnet er sygt og har feber eller hoste på operationsdagen, bedes I kontakte klinikken på tlf. 4826 7745 – nummeret må også benyttes, hvis der er spørgsmål op til operationsdagen og i dagene efter operationsdagen.

Vi vil bede jer om, at barnet har været på toilettet umiddelbart inden operationen.

Vi beder om at barnet/den voksne ikke har make-up på og har fjernet evt. neglelak.

Operationen:

Operationen foregår i fuld bedøvelse. Anæstesi-lægen henter barnet og jer i venteværelset og følger jer ind på operationsstuen.

Bedøvelsen gives via maske. Det er normalt, at man vrider sig lidt i søvne når bedøvelsen indledes.

Under operationen opholder pårørende sig i venteværelset.

Efter operationen observeres barnet i et af vores opvågningsrum.

Pårørende bliver kaldt ind til barnet. Barnet skal ligge stille for sig selv under første del af opvågningen og kan evt. have en lille tungeholder i munden for at lette vejtrækningen de første par minutter.

I skal være på klinikken til barnet er helt vågent. Det er en god ide, at være 2 under forløbet og hjemtransporten, så den ene kan holde øje med barnet.

Selve operationen

Drænet fjernes. Der ridses omkring hullet i trommehinden og når det bløder lægges spongostaner (selvopløselige svampe) i hullet. Der dryppes med antibiotika-dråber.

Hjemme igen

De første 3 dage må barnet kun helst nyse med åben mund. Ved bad og hårvask skal det opererede øre dækkes til med plastfilm eller et plastikkrus.

Barnet må ikke gå i svømmehal den første måned og kontaktsport eller anden sport der forårsager hovedrystelser frarådes de første 3 uger. Ved smerter anbefales Panodil (paracetamol).

Begynder øret at flyde de første 10 dage, skal I kontakte klinikken. Det samme gælder hvis øreflippen bliver rød, øm og opsvulmet.

Kontroltid af øret gives ca. 3 uger efter operationen.

Kontroltid: _____ dag d. _____ / _____ kl.

Rev.jan.26