

Jesper Hald og Jeppe Schwenger
Speciallæger i øre, næse, halssygdomme
Dyrehavevej 19, 3400 Hillerød, tlf.: 48267730

Vejledning for børn, som skal have lappet trommehinden

Mødetid: _____ dag d. _____ / _____ kl.

På operationsdagen:

Barnet må ikke få noget at spise, dvs. skal faste, **6 timer før operationen.**

Barnet må dog spise sodavands-is, drikke vand, saftvand og the uden mælk indtil **2 timer før operationen.**

Såfremt barnet er sygt og har feber eller hoste på operationsdagen, bedes I kontakte klinikken på tlf.4826 7745 – nummeret må også benyttes, hvis der er spørgsmål op til operationsdagen og i dagene efter operationsdagen.

Vi vil bede jer om, at barnet har været på toilettet umiddelbart inden operationen.

Vi beder om at barnet/den voksne ikke har make-up på og har fjernet evt. neglelak.

Operationen:

Operationen foregår i fuld bedøvelse. Anæstesi-lægen henter barnet og jer i venteværelset og følger jer ind på operationsstuen.

Bedøvelsen gives via maske. Det er normalt, at man vrider sig lidt i søvne når bedøvelsen indledes.

Under operationen opholder pårørende sig i venteværelset.

Efter operationen observeres barnet i et af vores opvågningsrum.

Pårørende bliver kaldt ind til barnet. Barnet skal ligge stille for sig selv under første del af opvågningen og kan evt. have en lille tungeholder i munden for at lette vejtrækningen de første par minutter.

I skal være på klinikken til barnet er helt vågent. Det er en god ide, at være 2 under forløbet og hjemtransporten, så den ene kan holde øje med barnet.

Selve operationen

Øreflippen afvaskes med sprit og der skæres et lille hul på bagsiden. Herfra tages en fedtklump stor nok til at dække hullet i trommehinden. Såret syes og dækkes med plaster. Der rides omkring hullet i trommehinden og når det bløder lægges fedtet gennem hullet. Der lægges en gazestrimmel med salve indeholdende antibiotika til at støtte helingen og et plaster sættes over.

Hjemme igen

De første 3 dage må barnet kun helst nyse med åben mund. Ved bad og hårvask skal det opererede øre dækkes til med plastfilm eller et plastikkrus.

Barnet må ikke gå i svømmehal den første måned og kontaktsport eller anden sport der forårsager hovedrystelser frarådes de første 3 uger. Ved smerter anbefales Panodil (paracetamol).

Begynder øret at flyde de første 10 dage, skal I kontakte klinikken. Det samme gælder, hvis øreflippen bliver rød, øm og opsvulmet.

Gazestrimlen fjernes 3 uger efter operationen, hvor det endelige resultat også kontrolleres.

Kontroltid: _____ dag d. _____ / _____ kl.

Rev.jan.26/hr